

Código: CRE-FT029
Nombre: **MANCYL WP**

Junio 2014
Re-emplaza Marzo 2013

EMERGENCIAS QUÍMICAS - CISPROQUIM
Servicio gratuito 24 horas
Línea Nacional: 018000-916012, Bogotá: 2886012

Página 1 de 3

FICHA TECNICA **MANCYL[®] WP**

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

REGISTRO NACIONAL ICA No. 199
Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingredientes activos:

Cymoxanil: 1-(2-ciano-2-metoxi-iminoacetil)-3-etilurea:..... **8%**.

Mancozeb: Producto de la coordinación del ion zinc con el etilenbisditiocarbamato de manganeso:..... **64%**.

Ingredientes aditivos..... **c.s.p. 100%**.

GENERALIDADES

MANCYL[®] WP, es un fungicida de acción preventiva y de post infección cuando el hongo esta en incubación. Además, posee actividad sistémica local lo cual mejora su efecto, especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad. Su forma de empleo es en aspersión foliar.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	P.C.*	PR
Papa	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>).	2 kg /ha, ó 500 g /200 litros de agua, ó 50 g /bomba de 20 litros.	Cada 7 a 14 días.	14 días	12 horas
Tomate	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>), Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>).	2 kg /ha, ó 500 g /200 litros de agua, ó 50 g /bomba de 20 litros.	Cada 3 a 7 días dependiendo del grado de infección.	5 días	12 horas
Vid	Mildeo veloso (<i>Plasmopara viticola</i>), Polvillo (<i>Uncinula necator</i>).	2 kg /ha, ó 1000 g /200 litros de agua, ó 5 g /bomba de 1 litro.	Cada 3 a 7 días dependiendo del grado de infección, aplicando en forma	66 días	12 horas

		(A)	alterna con mancozeb.		
Cebolla	Mildeo veloso (<i>Peronospora destructor</i>).	1,5 kg /ha.	(B)	7 días	12 horas

* **P.C. (Periodo de carencia):** Días entre la última aplicación y la cosecha.

(A) Cuando se utilizan 400 litros /ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

(B) Aplique la dosis recomendada cada 15 días en cultivos sembrados en surco, a partir de plantas con 5 hojas activas y una densidad de siembra de 370000 plantas /ha. En cultivos con mayores densidades de siembra y/o tamaño de plantas, ajuste la dosis mencionada. No se recomienda usar intervalos de aplicación mayores a 30 días. El intervalo entre las aplicaciones depende de las condiciones climáticas, presión de la enfermedad, variedad y estado del cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Disuelva completamente la cantidad de **MANCYL® WP** que va a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad, complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que va a llenar el equipo.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

MANCYL® WP es incompatible con productos cálcicos y productos foliares con alto contenido de nitrógeno. No puede mezclarse con productos a base de urea o que contengan amoníaco, ya que lo anterior genera floculación. No aplicar con productos alcalinos (que eleven el pH de la mezcla por encima de 8.5), evitando así la degradación del cymoxanil. No es aconsejable mezclarlo con caldo bordelés, productos borados, aceites ni formulaciones EC.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Generales:	En caso de sospechase intoxicación, detener el trabajo y buscar asistencia médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo mientras llega la ayuda médica
Ojos:	Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 15 minutos.
Ingestión:	Acudir al médico inmediatamente. Si el producto se ha ingerido, enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito
Inhalación:	Trasladar el paciente a un lugar aireado
Piel:	Remover y aislar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar con abundante agua y jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar atención médica
Antídoto:	No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de recuperación general.

GUÍA PARA EL MÉDICO

- **Síntomas de intoxicación:** La ingestión genera diarrea, náusea y vómito. La inhalación genera dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar y tos. El contacto con la piel y los ojos genera enrojecimiento, dermatitis y dolor. Otros: Nerviosismo, vértigo, visión borrosa, calambres y molestia en el pecho.
- **Tratamiento:** No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.
- **Contraindicaciones:** Alcohol.

ADVERTENCIA: “NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE EMPAQUE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO, Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA TAL FIN.

PRESENTACIONES: 500 gr

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: DT – 563 - 2005
LIGERAMENTE PELIGROSO**