

Código: CRE-FT065
Nombre: **SPRINTER® 75 WG**

Junio 2014
Re-emplaza Marzo 2013

EMERGENCIAS QUÍMICAS - CISPROQUIM
Servicio gratuito 24 horas
Línea Nacional: 018000-916012, Bogotá: 2886012

Página 1 de 4

FICHA TECNICA **SPRINTER® 75 WG**

HERBICIDA AGRÍCOLA

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1032
Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo:

Metribuzin..... **750 g/kg**
4-amino-6-tert-butyl-4,5-dihydro-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-one; de formulación a 20 °C.

Ingredientes Aditivos:.....**c.s.p. 1 Kilo**

GENERALIDADES

SPRINTER® 75 WG es un herbicida selectivo sistémico usado para el control pre y post-emergente de malezas de hojas anchas y algunas gramíneas en cultivos de soya, papa, tomate y zanahoria, principalmente.

SPRINTER® 75 WG, es absorbido por las malezas principalmente por la raíz, pero también por las hojas, con posterior translocación acropétala a través del xilema.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN	P.R.
Papa	Cerraja (<i>Sonchus oleraceus</i>) cenizo (<i>Chenopodium paniculatum</i>) malva (<i>Malva silvestris</i> L.) nabo (<i>Brassica spp</i>)	0.8 kg/ha	Post-emergencia temprana: de 10 a 15 días después de emergencia del cultivo. Aplicar siempre con buenas condiciones de humedad del suelo.	12 horas
Soya	Palo de agua (<i>Ludwigia linifolia</i>) Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>)	0.4 - 0.45 kg/ha	Se debe utilizar en pre emergencia total al cultivo y a la maleza. Utilizar un volumen de	

	Botón negro (<i>Hyptis capitata</i>) Pepino (<i>Cucumis sativus</i>) Bicho (<i>Senna obtusifolia</i>) Botoncillo (<i>Caperonia palustris</i> (L.)) Rabo de alacrán (<i>Heliotropium indicum</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubbius</i>) Batatilla (<i>Ipomoea nil</i> (L.)) Pincilito (<i>Emilia sonchifolia</i>) Tomillo (<i>Mollugo verticillata</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Frijolillo (<i>Corchorus orinosensis</i>) Golondrina (<i>Euphorbia hirta</i>) Malva (<i>Malachra capitata</i> (L.))		200 L de agua/ha. Utilizar una dosis menor en suelos arenosos.
Tomate	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Gualola (<i>Polygonum sp.</i>) Malva (<i>Malva silvestris</i> L.) Nabo (<i>Brassica sp</i>) Cerraja (<i>Sonchus oleraceus</i>) Cenizo (<i>Chenopodium paniculatum</i>)	0.4 a 0.45 kg/ha	Post-emergencia temprana: de 10 a 15 días después de Trasplante del cultivo. Aplicar siempre con buenas condiciones de humedad del suelo para obtener eficacia. Aplicar dosis mayor en condiciones de mayor desarrollo de malezas.
Zanahoria	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>), Gualola (<i>Polygonum sp.</i>) Nabo (<i>Brassica sp</i>) Yuyito (<i>Senecio vulgaris</i>)".	0.45 kg/ha	Post-emergencia temprana: de 15 a 20 días después de siembra del cultivo, cuando la zanahoria tenga de 3 a 4 hojas. Aplicar siempre con buenas condiciones de humedad del suelo.

PC = Periodo de Carencia: Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha. **No aplica para ningún cultivo por la época de aplicación del herbicida.**

PR = Periodo de reingreso al área tratada. (Horas).

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

Aplicar **SPRINTER® 75 WG**, una sola vez por ciclo de cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

SPRINTER® 75 WG, se puede aplicar con equipos convencionales los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso, limpios y debidamente calibrados, para obtener un óptimo desempeño del producto.

Para preparar la mezcla de la aspersión, agregue agua hasta la mitad del tanque y luego la cantidad recomendada de **SPRINTER® 75 WG** agitándolo bien. Complete el volumen con agua y continúe agitando hasta que el producto este bien disuelto, luego proceda a

realizar la aplicación. Los equipos de aplicación deben estar limpios y perfectamente calibrados.

Limpie bien todo el equipo inmediatamente después de aplicar el producto hasta asegurarse que no queden residuos, ya que se pueden generar daños a cultivos susceptibles que se fumiguen después: cucurbitáceas, coles, lechuga, fresas o tabaco.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

En caso de requerirse mezcla de **SPRINTER® 75 WG** con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación bajo la responsabilidad del usuario. No se recomienda incluir el producto en mezclas altamente concentradas.

SPRINTER® 75 WG, No es fitotóxico si se aplica en la dosis y forma recomendada en esta etiqueta. Puede causar fitotoxicidad en cultivos como cucurbitáceas, coles, lechuga, fresas y tabaco.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela esta ficha técnica.

Generales:	En caso de sospecharse intoxicación, detener el trabajo y buscar asistencia médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo mientras llega la ayuda médica.
Ojos:	Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina, por lo menos durante 20 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión:	Acudir al médico inmediatamente. Inducir al vómito únicamente si la persona está consciente y ha ingerido una cantidad muy grande del producto. Nunca provocar el vómito en una persona inconsciente ni administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado.
Inhalación:	Si experimenta algún malestar, retírese inmediatamente de la zona de exposición a un lugar con aire fresco. Obtenga asistencia médica si el malestar persiste.
Piel:	Quitar y aislar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar con abundante agua y jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar atención médica.
Antídoto:	No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de recuperación general.

GUÍA PARA EL MÉDICO

Síntomas de intoxicación: No se han reportado efectos adversos en humanos. Dosis altas de compuestos similares que han sido suministradas a animales, han causado salivación, disminución de la actividad, espasmos musculares, ataxia e incremento de la temperatura corporal.

Código: CRE-FT065
Nombre: **SPRINTER® 75 WG**

Junio 2014
Re-emplaza Marzo 2013

Página 4 de 4

Tratamiento: En caso de ingestión, hacer un lavado gástrico con agua. Puede suministrar carbón medicinal en las primeras 2 horas luego de una elevada ingestión. Seguir tratamiento sintomático y de recuperación general.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: DTT-2210-2011
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO**