

Código: CRE-FT068
Nombre: **WIKING® 200 SE**

Marzo 2013
Re-emplaza Mayo 2011

EMERGENCIAS QUÍMICAS - CISPROQUIM
Servicio gratuito 24 horas
Línea Nacional: 018000-916012, Bogotá: 2886012

Página 1 de 3

FICHA TECNICA **WIKING® 200 SE**

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN (SE)

Registro Nacional ICA No. 919
Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo:

Fipronil..... **200 g/l**
-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile, de formulación a 20 °C.

Ingredientes Aditivos: **c.s.p. 1 litro**

GENERALIDADES

WIKING® 200 SE, pertenece al grupo químico de los Fenil Pirazoles. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos y no presenta resistencia cruzada con otros grupos químicos de insecticidas.

WIKING® 200 SE es un Insecticida de amplio espectro, actúa por contacto e ingestión, moderadamente sistémico, recomendado para el control de insectos perforadores, chupadores, masticadores y trozadores. Posee un excelente control residual en aplicaciones foliares seguidas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS	P.R.	P.C. (días)
ALGODÓN	PICUDO	<i>Anthonomus grandis</i>	325 cc/ha	12 horas	15
ARROZ	CUCARRO	<i>Eutheola bidentata</i>	300 cc/ha		7
	GRILLOTALPA	<i>Neocurtilla hexadactyla</i>	300 cc/ha		30
PAPA	GUSANO BLANCO	<i>Premnotrypes vorax</i>	0.6 L/ha		14
REPOLLO	PALOMILLA DORSO DE DIAMANTE	<i>Plutella xylostella</i>	0.4 L/ha		14
CEBOLLA DE BULBO	TRIPS	<i>Thrips tabaci</i>	0.6 L / ha ó 1.2 cc/L*	14	

P.C.: Periodo de carencia: Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de re-entrada: Tiempo requerido entre la última aplicación y la entrada de personal sin equipo de protección personal al área tratada.

* Para un volumen de aplicación promedio de 500 L/Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

El producto **WIKING® 200 SE** debe ser usado en aspersión dirigida al follaje del cultivo, dentro de un esquema de Manejo Integrado de Plagas, cuando los insectos-plaga se encuentren en un umbral de daño inicial dentro del cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

WIKING® 200 SE, se puede aplicar con equipos convencionales los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso, limpios y debidamente calibrados, para obtener un óptimo desempeño del producto.

Para preparar la mezcla de la aspersión, agregue agua hasta la mitad del tanque y luego la cantidad recomendada de **WIKING® 200 SE** agitándolo bien. Complete el volumen con agua y continúe agitando hasta que el producto este bien emulsionado, luego proceda a realizar la aplicación.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

WIKING® 200 SE es compatible con la mayoría de los insecticidas usados convencionalmente, sin embargo, en caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación bajo la responsabilidad del usuario.

Se ha demostrado que **WIKING® 200 SE** no es fitotóxico sobre los cultivos recomendados, si se usa de acuerdo con las dosis propuestas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle esta ficha técnica.

Generales:	En caso de sospecharse intoxicación, detener el trabajo y buscar asistencia médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo mientras llega la ayuda médica.
Ojos:	Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina, por lo menos durante 20 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión:	Acudir al médico inmediatamente. Inducir al vómito únicamente si la persona está consciente y ha ingerido una cantidad muy grande del producto. Nunca provocar el vómito en una persona inconsciente ni administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado.
Inhalación:	Llevar la víctima al aire fresco. Si la víctima no está respirando, suministre respiración artificial boca a boca o con ayuda de una máscara de respiración

	u otro dispositivo médico de respiración. Si los síntomas continúan busque atención médica inmediata.
Piel:	Remover y aislar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar con abundante agua y jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar atención médica.
Antídoto:	No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de recuperación general.

GUÍA PARA EL MÉDICO

Síntomas de intoxicación: Los síntomas por intoxicación causados por exposición al Fipronil son falta de aire, temblor involuntario, excitación, irritabilidad y convulsiones.

Tratamiento: En caso de ingestión, hacer un lavado gástrico con agua. Puede suministrar carbón medicinal en las primeras 2 horas luego de una elevada ingestión. Seguir tratamiento sintomático y de recuperación general.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II: DTT-1939-2010
MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO**